

BCG接種について

BCGワクチンとは結核を予防するワクチンです。

このワクチンは生後1歳に至るまでに接種するとされていますが、生後5～8ヶ月を標準的な接種期間として行うのが望ましいです。

BCG接種に関することで何か心配なことなどがありましたら医師までご相談ください。

＊BCG接種で来院される患者様へおねがい＊

BCG予防接種は注射器での予防接種とは違い、ワクチン（スタンプ式）がきちんと乾くまで別室で裸で待機していただくことになります。

- ・ **接種1時間前は飲食は控えて下さい。**
- ・ 乾かす時間含め、30分～1時間程度かかります。
- ・ 接種部位を乾かしている間は接種部位に接触するものがない状態である必要があります。髪の毛が長い保護者の方は赤ちゃんに髪の毛が触れないようにゴムやクリップなどでしっかり髪の毛を束ねてから、予防接種を受けていただくようご協力をお願いいたします。また、衣服なども接種部位につかないよう下着は半袖やノースリーブでお越しく下さい。
- ・ 接種後1時間は接種部位を紫外線に当てないように、羽織る物をご持参ください。
- ・ 小さいお子様（ご兄弟など）と一緒に来院される方は、接種後赤ちゃんの接種部位に触れないようお子様から目を離さないようにしてください。
- ・ 予約時間を過ぎると接種できない場合がございますので、時間厳守をお願い致します。

タムスわんぱくクリニック西葛西駅前

